

绝密 ★ 考试结束前

全国 2018 年 4 月高等教育自学考试 内科护理学(二) 试题

课程代码:03202

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 患者,男性,22 岁,3 天前受凉后出现高热,体温最高达 39℃,伴咳嗽、咳痰,为黄色黏痰,初步诊断为“肺炎”。为进一步明确致病菌,医嘱留取痰标本进行细菌培养。护士在进行痰标本留取时,正确的做法是
A. 随机留取一口痰液
B. 嘱患者用力咳出深部痰液
C. 痰标本置于无盖容器方便检测
D. 痰标本静置 3 小时后送检
2. 患者,女性,33 岁,因“支气管哮喘”入院。责任护士对糖皮质激素的用药指导,正确的是
A. 抑制气道炎症应长期吸入糖皮质激素
B. 吸入 24 小时后即可生效
C. 吸入后不可漱口以免降低药效
D. 可预防变应原引起的速发和迟发反应
3. 患者,男性,45 岁,因“间断咯血 3 天”入院。入院后即出现咯血一次,量约 400ml。该患者的咯血量为
A. 微量
B. 小量
C. 中量
D. 大量
4. 患者,女性,72 岁,因慢性心力衰竭长期服用洋地黄类药物治疗,近日出现疲乏、食欲减退、头痛、头晕、黄视等症状,应首先考虑其发生了
A. 左心衰竭加重
B. 洋地黄类药物中毒
C. 电解质紊乱
D. 继发感染

5. 患者，男性，41岁，发现血压升高5年，间断口服降压药物治疗。近一周连续熬夜工作后，突发剧烈头痛伴视物模糊，急诊以“高血压急症”收入院，该患者快速降压治疗首选
- A. 硝普钠
B. 氢氯噻嗪
C. 甘露醇
D. 乌拉地尔
6. 目前已知最强的胃酸分泌抑制剂是
- A. 抗酸药
B. H₂受体拮抗剂
C. 质子泵抑制剂
D. 胶体次枸橼酸铋
7. 对于诊断溃疡性结肠炎最有价值的检查项目是
- A. 血液检查
B. 粪便检查
C. 结肠镜检查
D. X线钡剂灌肠检查
8. 患者，男性，60岁，因“慢性肾衰竭”入院。入院后肾功能检查结果为：内生肌酐清除率8ml/min，血肌酐820μmol/L，尿素氮20mmol/L。根据我国慢性肾衰竭分期方法，该患者属于
- A. 肾功能代偿期
B. 氮质血症期
C. 肾衰竭期
D. 尿毒症期
9. 患者，女性，29岁，因“月经量过多伴乏力半年”门诊就诊。查体可见四肢皮肤黏膜散在出血点，血小板计数 $45 \times 10^9/L$ ，初步诊断为“特发性血小板减少性紫癜”，该患者首选的治疗应是
- A. 输注浓缩血小板
B. 血浆置换
C. 脾切除
D. 糖皮质激素治疗
10. 患者，女性，45岁，既往体健，近半年来乏力伴心动过缓，门诊诊断为“甲状腺功能减退症”，该患者发病的原因可能是
- A. 遗传因素
B. 病毒感染
C. 自身免疫损伤
D. 药物因素
11. 患者，女性，36岁，患“系统性红斑狼疮”10余年，半月前因狼疮活动激素用量明显加大，因药物引起的不良反应是
- A. 血糖升高
B. 血压下降
C. 食欲减退
D. 骨髓抑制
12. 患者，男性，51岁，因在高温环境下持续工作导致“热射病”急诊入院。患者体温41℃，为迅速降温采取的措施中，不妥的是
- A. 冰水、酒精擦浴
B. 氯丙嗪静脉点滴
C. 大血管处放置冰袋
D. 口服阿司匹林
13. 患者，男性，27岁，半年前被犬咬伤后未及时注射疫苗。3天前突感已愈合伤口附近有麻木及蚁走等异常感觉，诊断为“狂犬病”。此时患者处于疾病的
- A. 潜伏期
B. 前驱期
C. 兴奋期
D. 麻痹期

14. 患者，男性，58岁，因“剧烈腹泻、呕吐1天”急诊入院。患者自述1周前曾饮用不洁水，拟诊为“霍乱”，该患者治疗的关键是
- A. 抗菌治疗
 - B. 补液治疗
 - C. 强心治疗
 - D. 抗病毒治疗
15. 脑卒中患者预防脑血管病发生，最重要的环节是控制
- A. 高血压
 - B. 心脏病
 - C. 糖尿病
 - D. 血脂异常

二、多项选择题：本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 护士对哮喘患者进行定量雾化吸入器的使用指导中，正确的是
- A. 吸入前摇匀药液
 - B. 呼气至不能再呼，将喷嘴放入口中
 - C. 经鼻吸气同时按压驱动装置
 - D. 吸入药物后尽可能屏气10秒
 - E. 吸入后快速用力呼气以利药物吸收
17. 肺血栓栓塞症中的“肺梗死三联征”是指
- A. 呼吸困难
 - B. 胸痛
 - C. 晕厥
 - D. 烦躁
 - E. 咯血
18. 关于呼吸衰竭氧疗的叙述中，正确的是
- A. 氧疗是抢救呼吸衰竭基本而关键的一环
 - B. 急性呼衰吸入中、高浓度氧气
 - C. 急性呼衰氧疗目标为动脉氧分压提高到60~80mmHg
 - D. 慢性Ⅱ型呼衰吸入低浓度氧气
 - E. 慢性Ⅱ型呼衰氧疗目标为动脉氧分压略高于60mmHg
19. 与高血压发病密切相关的因素是
- A. 高盐饮食
 - B. 精神应激
 - C. 环境因素
 - D. 遗传因素
 - E. 肥胖
20. 心肌梗死后综合征是指心梗后数周至数月出现
- A. 心脏破裂
 - B. 心包炎
 - C. 肺炎
 - D. 栓塞
 - E. 胸膜炎
21. 消化性溃疡药物治疗的用药指导，正确的是
- A. 抗酸药应在餐后1小时和睡前服用
 - B. 抗酸药应与奶制品同服以促进吸收
 - C. H₂受体拮抗剂常于餐前服用
 - D. 吸烟会降低H₂受体拮抗剂的疗效
 - E. 胃黏膜保护药不宜与抗酸药同服

22. 慢性肾衰竭处于氮质血症期的患者, 饮食护理措施正确的是
- A. 优质低蛋白饮食 B. 热量主要由脂肪提供
- C. 主食以麦淀粉为主 D. 水肿、高血压者应当限盐
- E. 控制磷的摄入
23. 白血病患者诱导缓解治疗期间, 提示患者已达到完全缓解的标准有
- A. 白血病的症状、体征消失
- B. 骨髓象基本正常
- C. 中性粒细胞绝对值 $\geq 1.0 \times 10^9/L$
- D. 外周血分类中原始、幼稚白血病细胞 $\leq 5\%$
- E. 红系、巨核系正常
24. 系统性红斑狼疮患者皮肤护理措施正确的是
- A. 避免阳光较强的时间外出 B. 宜用强碱性肥皂清洁皮肤
- C. 最好用冷水洗脸 D. 勿用各类化妆品
- E. 指甲勿修剪过短
25. 护士对脑梗死患者体位摆放的指导, 正确的是
- A. 保持肩关节外展 B. 保持肘关节伸直
- C. 保持髋关节外旋 D. 保持膝关节伸直
- E. 足背屈与小腿呈直角

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、填空题: 本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分。

26. 肺炎患者因炎症累及胸膜出现一侧胸痛时, 应采取_____卧位以缓解疼痛。
27. 肺结核是由_____引起的慢性肺部感染性疾病。
28. 肺心病死亡的首要原因是_____。
29. 长期家庭氧疗(LTOT)一般采用鼻导管吸氧, 吸氧时间为每天 \geq _____小时。
30. 脉搏氧饱和度(SpO_2)用来评价氧合功能, SpO_2 小于_____%提示为低氧血症。
31. 硝酸甘油见光易分解, 应避光保存, 最好_____个月更换1次。
32. 心动过缓患者应避免屏气用力动作, 以免兴奋_____神经而加重心动过缓。
33. 永久性房颤可应用_____类药物控制心室率。
34. 在肝性脑病的治疗中, 为使肠内呈酸性以减少肠内毒物的生成和吸收, 长期治疗首选的药物为_____。
35. 诊断急性胰腺炎最常用的实验室指标是血、尿_____测定。
36. 女性在经期、妊娠期、_____期, 因内分泌改变, 使肾盂肾炎易感性增加。
37. 慢性肾衰竭患者发生贫血的最主要原因是肾脏产生_____减少。

38. 出生后人体的主要造血器官是_____。
39. 缺铁性贫血儿童出现神经、精神系统症状与脑组织中_____活性降低有关。
40. 抗甲状腺药物主要副作用是_____，常突然发生且为致命性。
41. 干燥综合征是一种侵犯_____、唾液腺等外分泌腺体，以高度淋巴细胞浸润为特征的弥漫性结缔组织病。
42. 系统性红斑狼疮患者在手掌的大小鱼际、指端及指（趾）甲周也可出现红斑，这些都是_____的表现。
43. 有机磷中毒的主要死因是_____。
44. 决定传染病流行过程的三个基本条件是传染源、传播途径和_____。
45. 肾综合征出血热是由_____病毒引起的自然疫源性疾。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 支气管哮喘
47. 病毒性心肌炎
48. 急性胰腺炎
49. 白血病
50. 帕金森病

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述缩唇腹式呼吸的训练方法。
52. 简述肾病综合征患者水肿部位的皮肤护理要点。
53. 简述糖尿病患者发生糖尿病足的危险因素。
54. 简述对服用镇静催眠药物患者给予的用药指导内容。

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，男性，25 岁，半年前于感冒后出现逐渐加重的胸闷、心悸、气急，近一个月常有夜间阵发性呼吸困难，昨晚大便后出现呼吸困难并加重，不能平卧，伴咳嗽，咳泡沫样痰及粉红色血色痰而就诊入院。

查体：T 37.4℃，R 28 次/分，P 126 次/分，BP 124/72mmHg，口唇发绀，大汗，端坐呼吸，颈静脉怒张，双肺布满中小水泡音及哮鸣音，叩诊心界扩大，HR 126 次/分，律齐，心尖部可闻及舒张期奔马律，触诊肝脏肿大，肝颈回流征阳性，双下肢轻度可凹性水肿。辅助检查：X 线胸片呈普大型心脏，心脏多普勒检查示心腔均扩大，LVEF（左室射血分数）在 29%。初步诊断为“急性左心衰竭，全心衰竭，扩张型心肌病”。

请写出：

- (1) 该患者发生全心衰竭的主要病因；
- (2) 该患者诊断为“急性左心衰竭”的主要依据；
- (3) 该患者的主要护理措施。

56. 患者，男性，45岁，主因“乏力、纳差5年，加重伴腹胀3个月”门诊入院。患者5年前无明显诱因出现乏力、纳差。3年前因骨折于当地医院手术治疗，术前体检发现HBsAg(+)，肝功能异常，未做进一步诊断和治疗。近3个月来，自觉疲乏无力明显，食欲减退，伴腹胀。为进一步治疗收入院。既往吸烟20余年，饮酒20余年，父亲死于“肝病”。

查体：T 37°C，R 18次/分，P 78次/分，BP 126/68mmHg，肝病面容，巩膜稍黄染，前胸部可见数颗蜘蛛痣。心肺(-)。腹部膨隆，脐周可见迂曲扩张静脉，腹软、全腹无压痛反跳痛，肝脏肋下未触及，脾脏肋下约3cm，边界清晰无压痛，移动性浊音(+)，双下肢不肿。辅助检查：HBsAg(+)，HBeAg(+)，HBcAb(+);血氨不高;胃镜提示食道静脉轻度曲张。初步诊断为“肝硬化失代偿期”，给予休息、保肝、利尿等治疗。

请写出：

- (1) 该患者发生肝硬化的主要病因;
- (2) 该患者诊断为“肝硬化失代偿期”的主要依据;
- (3) 该患者的饮食护理措施。